

# ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS

## ADVIESBRIEF 41

### CHRONISCHE TANDVLEESONTSTEKING BIJ DE KAT

#### Wat is het?

Het “gingivitis-stomatitis complex” (de wetenschappelijke naam voor chronische tandvleesontsteking ) is een **zeer pijnlijke** en complexe aandoening bij de kat. Het is een *steeds terugkerende of langdurig aanwezige slijmvliesontsteking in de bek* van de kat. De ontsteking bestaat uit gingivitis (tandvleesontsteking), stomatitis (ontsteking van het slijmvlies van de wang) en soms ook pharyngitis (ontsteking van het achterste slijmvlies in de bek bij de overgang van onderkaak naar bovenkaak). Deze ontstekingen reageren slecht tot niet op medicijnen.



*Twee duidelijke gevallen van zwaar ontstoken tandvlees bij de kat*

#### Wat zijn de klachten?

Een kat kan jaren met ontstekingen in de mond rondlopen, zonder dat de eigenaar het merkt. Deze ontstekingen kunnen wel opgemerkt worden tijdens een mondinspectie bij de jaarlijkse gezondheidscontrole door de dierenarts. Wanneer de ontstekingen echter al ernstig uitgebreid zijn, kunnen de volgende zaken opvallen:

- stinkende adem

- overmatig speekselen
- niet meer willen eten
- eenzijdig kauwen
- weigeren hard voer te eten
- teruggetrokken gedrag
- vermageren
- pijnlijke mond
- plotseling schreeuwen bij de voerbak.

### Bij welke katten komt het voor?

Het gingivitis-stomatitis complex kan voorkomen op alle leeftijden. De problemen beginnen vaak al op jonge leeftijd maar de echte klachten worden vaak helaas pas op oudere leeftijd (tussen de 5 en 7 jaar) gezien. De Maine Coon, Siamees, Burmees en Oosterse Korshaar hebben vaker dan gemiddeld last van deze ziekte.

### Wat zijn de oorzaken van het gingivitis-stomatitis complex?

Gingivitis-stomatitis complex bij de kat is een complexe aandoening. Er spelen vaak meerdere oorzaken samen een rol. Mogelijke samenhangende oorzaken voor het gingivitis-stomatitis complex zijn:

- *gebitsproblemen*
  - tandplak en -steen
  - afgebroken tanden en kiezen
  - beschadigingen van het email tanden en kiezen
- *virussen*
  - FIV (kattenaids)
  - FeLV (kattenleukemie)
  - Calicivirus (niesziekte)
- *algemene aandoeningen*
  - nierfalen
  - suikerziekte
- *onvoldoende werkend afweersysteem*
- *overgevoeligheid voor tandplak; begint op een leeftijd van 6 maanden*
- *achtergebleven wortelresten na het trekken van kiezen of tanden.*

Helaas kan het ook voorkomen dat er geen oorzaak te vinden is voor het ontstaan van het gingivitis-stomatitis complex.

### Hoe gaan we de diagnose stellen bij gingivitis-stomatitis?

De diagnose kan door een eenvoudige mondinspectie worden gesteld. Ook wordt tijdens deze controle gekeken naar de mate van aanwezig tandsteen en tandplak, eventuele afgebroken tanden en/of kiezen en glazuurletsels op tanden en kiezen. Vervolgens neemt de dierenarts bloed af om te testen op FIV en FeLV. Bij verdenking op een algemene aandoening zoals suikerziekte of nierfalen, zal er aanvullend bloedonderzoek worden uitgevoerd.

### Behandeling van chronische tandvleesontsteking

Samen met u stelt de dierenarts een behandelplan op. We starten sowieso met het toedienen van pijnstillers.

Het verdere behandelplan is afhankelijk van de ernst en uitgebreidheid van de klachten en van de oorzaak. Indien er veel tandsteen aanwezig is, zal de dierenarts u een professionele gebitsreiniging voorstellen als eerste stap in de behandeling. Als er ten gevolge van de ontsteking al losse tanden of kiezen zijn, zullen die volledig worden verwijderd. Vervolgens wordt gestart met een antibioticumkuur en pijnstilling én is het van groot belang dat nieuwe tandplak- en tandsteenvorming wordt voorkomen.

Als er na de gebitsbehandeling toch nog ontstekingen in de mond terugkeren, of als er heftige ontstekingen zijn zonder dat er sprake is van tandsteen, adviseren wij om alle kiezen te laten trekken. Het is een zeer drastische beslissing maar wij zien vaak dat deze katten dezelfde dag alweer zacht voer gaan eten en binnen enkele dagen opnieuw hun brokjes verorberen. Bovendien verdwijnt de pijn na het trekken van de tanden en is de kat weer even vrolijk als vroeger!

Indien de problemen toch aanwezig blijven na het trekken van de kiezen, kan aanvullend (in geval van verdenking van een voedselallergie) gestart worden met een speciale soort voeding. Door deze voeding kan de ontsteking worden geremd. Een andere beslissing kan zijn om bij onvoldoende verbetering vervolgens ook de hoektanden en snijtanden te trekken.

### Wat zijn de vooruitzichten voor mijn kat?

De prognose is afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de aandoening. In veel gevallen zullen de ontstekingen in de bek niet helemaal verdwijnen na een professionele gebitsbehandeling en zal er uiteindelijk toch overgegaan moeten worden tot het trekken van de kiezen en soms ook hoektanden en snijtanden. Een groot deel van de katten knapt hier zeer goed van op en zal weer brokjes gaan eten, ondanks de afwezigheid van kiezen!

Een klein percentage van de katten zal toch onvoldoende reageren op totale extractie van alle tanden en kiezen. Dit zijn vaak de katten waarbij een virus de onderliggende oorzaak is. Er kan dan gestart worden met medicatie die het afweersysteem stimuleert. Aan het eind van de rit kunnen we met een aangepast behandelingschema het merendeel van de problemen oplossen en de poes van haar pijn verlossen.



Deze adviesbrief is een uitgave van **dierenartsenpraktijk DAP De Vrijheid** in Hoogstraten.

Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je gratis downloaden op [www.dapdevrijheid.be](http://www.dapdevrijheid.be). Voor meer diepgaand advies maak je best telefonisch een afspraak (tel. 03/314 87 67).

Neem ook eens een kijkje bij DAP De Vrijheid op **Facebook** en like ons als je het de moeite vindt!



*Dierenartsen Katrien Eelen, Veerle Guffens, Wendy Op De Beeck en Joke Yzewyn*